

# 階層的地球流体スペクトルモデル集

## SPMODEL

竹広真一（京大数理研） 佐々木洋平（北大理）

with

地球流体電脳倶楽部

SPMODEL プロジェクト

dcmmodel プロジェクト

Davis プロジェクト

2009年3月9日

# 本日のお題

数式を書くようにプログラミングする

しかも

スペクトル法の計算で?!

+

計算データの出力とお絵かき

# 例題：1次元移流方程式

- 1次元周期境界条件の下で解いてみる

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -c \frac{\partial \zeta}{\partial x}$$

- サンプルプログラム：`advect.f90`, `advect_if.f90`

- 解析解

初期条件  $\zeta(x, t = 0) = \zeta_0(x)$  に対して

$$\zeta(x, t) = \zeta_0(x - ct)$$

# まずは使ってみよう!

- コンパイル

**\$ spmfrt -o advect.out advect.f90**

→ advect.out ができる

- 実行

**\$ ./advect.out**

→ advect.nc ができる

- 結果表示

**\$ gplist advect.nc**

(変数のリスト)

**\$ gpview --anim t advect.nc@zeta**

(アニメーション)

**\$ gpview -range 0:1500 --anim t advect.nc@zeta**

**\$ gave advect.nc**

# 用いているテクニックとライブラリ

- Fortran90 : 配列計算機能

```
DO I=0,IM-1
```

```
  A(I) = B(I)+C(I)      →  A=B+C
```

```
ENDDO
```

```
DO I=0,IM-1
```

```
  DATA(I) = EXP(-X(I)**2) → DATA = EXP(-X**2)
```

```
ENDDO
```

- Fortran90 : 配列を返す関数を作る

→ spmodel library (spml) : 正/逆変換, 空間微分など

- 結果出力 : gtool5(gt4f90io)ライブラリ

- 結果表示 : Dennou-Ruby 製品 (gpview, gave など)

# スペクトル法による数値計算(離散化)

## 1. 境界条件を満たす関数系で展開

$$\zeta(x_j, t) = \sum_{k=-K}^K \tilde{\zeta}_k(t) e^{2\pi i k x_j / L}, \quad \tilde{\zeta}_k(t) = \frac{1}{J} \sum_0^{J-1} \zeta(x_j, t) e^{-2\pi i k x_j / L} dx$$

## 2. 方程式に代入すると常微分方程式になる

$$\frac{d\tilde{\zeta}_k}{dt} = -\frac{2\pi i k}{L} c \tilde{\zeta}_k$$

## 3. 適当な初期値から離散化して時間積分

$$\tilde{\zeta}_k(t + \Delta t) = \tilde{\zeta}_k(t) - i \frac{2\pi k c}{L} \tilde{\zeta}_k(t) \Delta t$$

## 4. 実空間の変数に戻す

$$\zeta(x_j, t) = \sum_{k=-K}^K \tilde{\zeta}_k(t) e^{2\pi i k x_j / L}$$

# 数値計算の手順

## 1. 使用するモジュールの宣言

```
use ae_module
```

## 2. 変数を宣言

```
real(8) :: g_Zeta(0:im-1)    ! 格子データ  
real(8) :: e_Zeta(-km:km)   ! スペクトルデータ
```

## 3. スペクトル変換の初期化

```
call ae_initial(im,km,xmin,xmax)
```

## 4. 初期値を与える

```
g_Zeta=U1*sech((g_X-X1)/sqrt(12/u1)))**2 + ...
```

## 5. スペクトルデータへ変換

```
e_Zeta = e_g(g_Zeta)
```

## 6. スペクトルで時間積分

```
e_Zeta = e_Zeta + dt*( -c*e_Dx_e(e_Zeta) )
```

## 7. 実空間データへ戻す (出力時)

```
g_Zeta = g_e(e_Zeta)
```

# spml/ae\_module

- スペクトル計算のためのサブルーチン・関数を提供
  - 初期化  
subroutine ae\_initial(im,km,xmin,xmax)
  - スペクトル正逆変換  
e\_g(g\_Data) ! 格子データ→スペクトルデータ  
g\_e(e\_Data) ! スペクトルデータ→格子データ
  - 微分計算  
e\_Dx\_e(e\_Data) ! x微分
  - 積分・平均計算  
Int\_g(g\_Data) ! 全領域積分  
Avr\_g(g\_Data) ! 全領域平均



# spml/ae\_module

- その中身は...

- ISPACKをFortran90の関数でくるんだもの  
FFT 用の変換テーブルを記憶  
領域の大きさを記憶→微分計算に使用

- 座標変数の設定 (g\_X, g\_X\_weight)

- 微分計算→波数をかけているだけ

$$e\_Dx\_e(k) = -2 * \pi * k / L * e\_Data(-k)$$

- ご利益：数式のごとくプログラムを書ける

$$f = \frac{\partial \zeta}{\partial x} \rightarrow e\_f = e\_Dx\_e(e\_Zeta)$$

$$f = \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} \rightarrow e\_f = e\_Dx\_e(e\_Dx\_e(e\_Zeta))$$

# spml プログラミング書法

- 先頭の文字で変数の種類を区別
  - 実空間格子点データ : **g\_** で始める
  - スペクトルデータ : **e\_** で始める
- spml の関数名の命名規則  
(出力の型)\_ (機能)\_ (入力の型)
- 縮約のごとくプログラムを書けば型を間違えない  
**g\_Data2=g\_e(e\_Dx\_e(e\_g(g\_Data1)))**

# 練習問題（その1）

- 移流方程式に拡散項を付け加えてみよう

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -c \frac{\partial \zeta}{\partial x} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2}$$

- Euler スキームだとこんな感じ

$$e\_Zeta = e\_Zeta + dt * ( -c * e\_Dx\_e(e\_Zeta) \& \\ + e\_Dx\_e(e\_Dx\_e(e\_Zeta)) )$$

# 非線形項の取り扱い（変換法）

- 移流項が非線形項  $\zeta \frac{\partial \zeta}{\partial x}$  である場合には

→ スペクトル変数をいちど実空間に戻してから積をとる（変換法）

- spml の関数を用いると一発で書ける

$e\_g( g\_e(e\_Zeta)*g\_e(e\_Dx\_e(e\_Zeta)))$

# 練習問題（その2）

- KdV方程式のプログラムをかいてみよう

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\zeta \frac{\partial \zeta}{\partial x} - \frac{\partial^3 \zeta}{\partial x^3}$$

- 切断波数のとり方に注意
  - 変数の積→高波数成分の生成  
→  $J \sim 2K+1$  の格子点数では十分に表せない
  - 2次の非線形項→格子点数を  $J > 3K+1$  にふやしておく

# SPMODEL プログラミング

1. 領域と境界条件に適合したモジュールを選択  
[1次元周期境界条件]

2. 支配方程式を形式的にスペクトル変換する

$$\frac{\partial \tilde{\zeta}_m}{\partial t} = - \left[ \zeta \frac{\partial \tilde{\zeta}}{\partial x} \right]_m - \left[ \frac{\partial^3 \tilde{\zeta}}{\partial x^3} \right]_m$$

3. 適当なスキームで時間に関して差分化

$$\tilde{\zeta}_m^{\tau+1} = \tilde{\zeta}_m^{\tau} + \Delta t \times \left\{ \left[ \zeta \frac{\partial \tilde{\zeta}}{\partial x} \right]_m - \left[ \frac{\partial^3 \tilde{\zeta}}{\partial x^3} \right]_m \right\}$$

4. 2と3にしたがってプログラムを書き下す

```
e_Zeta = e_Zeta + delta_t*( &  
-e_g(g_e(e_Zeta)*g_e(e_Dx_e(e_Zeta))) &  
-e_Dx_e(e_Dx_e(e_Dx_e(e_Zeta))) )
```

方程式の形そのままにプログラムできる!

# 一般的注意

- ライブラリ・サンプルプログラムは無保証
  - 必ず自分でテストしてみること
  - できれば解析解と比較してみる
- マニュアルを見よう
  - 気分でプログラムを書くのは危険
  - マニュアルで確認しつつ書くこと
- できればソースも見てみよう
  - spml のマニュアルを見てみよう

# 出力操作：gtool5(gt4f90io)

- モジュールの宣言

use gtool\_history (use gt4\_history)

- 出力ファイルの作成、次元の定義

call HistoryCreate

- 変数の定義

call HistoryAddVariable

- 出力

call HistoryPut

- 終了

call HistoryClose



# 練習問題 (3)

- gtool library のサブルーチンを使って出力の練習

- $\frac{\partial \zeta}{\partial x}$  を x,t の 2 次元データとして出力してみる

変数定義の追加, 出力ルーチンの追加

- $\int_0^L \zeta^2 dx$  を t の 1 次元データとして出力してみる

変数定義の追加 (次元に注意), 出力ルーチンの追加

# 例題：2次元拡散方程式

- 2次元周期境界条件の下で解いてみる

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \nu \left( \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} \right)$$

- サンプルプログラム：[diffuse\\_2d.f90](#)

コンパイルして実行してみよう  
ソースファイルを眺めてみよう

# gpview の便利なオプション

- 範囲指定

```
$ gpview --range 0:1 --anim t diffuse_2d.nc@zeta
```

- データ切出し

```
$ gpview --anim t diffuse_2d.nc@zeta,x=0.5
```

```
$ gpview diffuse_2d.nc@zeta,x=0.5,y=0.5
```

- 平均操作

```
$ gpview --mean x --anim t diffuse_2d.nc@zeta
```

- その他のオプション

```
$ gpview --help
```

# 練習問題（その4）

- 移流方程式に変えてみよう

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -c_x \frac{\partial \zeta}{\partial x} - c_y \frac{\partial \zeta}{\partial y}$$

- Euler スキームだとこんな感じ

```
ee_Zeta = ee_Zeta &  
+ dt*( -cx*ee_Dx_ee(ee_Zeta)-cy*ee_Dy_ee(ee_Zeta) )
```

- Leap frog スキームの方が安定性がよろしい

```
ee_Zeta2 = ee_Zeta0 &  
+ dt*( -cx*ee_Dx_ee(ee_Zeta1)-cy*ee_Dy_ee(ee_Zeta1) )  
ee_Zeta0 = ee_Zeta1; ee_Zeta1=ee_Zeta2
```

# 練習問題（その5）

- 線形  $\beta$  面順圧方程式に変えてみよう

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\beta \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad \nabla^2 \psi = \zeta$$

- Euler スキームだとこんな感じ

$$\text{ee\_Zeta} = \text{ee\_Zeta} + \text{dt} * (-\text{beta} * \text{ee\_Dx\_ee}(\text{ee\_Psi}))$$

$$\text{ee\_Psi} = \text{ee\_Laplaln}(\text{ee\_Zeta})$$

- （余力があれば）非線形ベータ面方程式に挑戦

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -J(\psi, \zeta) - \beta \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad \nabla^2 \psi = \zeta$$

# その他の例題

- 2次元ベータ面: モドン
- 2次元チャンネル領域: 熱対流問題
- 2次元球面領域: ロスビー波
- . . .

## Web を見てみよう

### - ローカル :

Desktop/SpmodelTutorial/NagareMultimedia/  
Desktop/SpmodelTutorial/spmodel/index.htm

### - ネット上 :

<http://www.nagare.or.jp/mm/2006/spmodel/>  
<http://www.gfd-dennou.org/library/spmodel/>